

A/J マウス

血液学的性状 平均値 ± 標準偏差 (N: 検査匹数)

項目 / 単位	雄		雌	
	10週齢 (N:10)		10週齢 (N:10)	
RBC × 10 ⁴ / mm ³	954 ± 16.9		963 ± 23.8	
Ht %	44.8 ± 1.44		46.5 ± 1.10	
Hb g / dl	14.1 ± 0.42		14.7 ± 0.95	
WBC × 10 ² / mm ³	25 ± 16.3		17 ± 10.0	
BP × 10 ⁴ / mm ³	105.5 ± 21.89		106.3 ± 15.02	
MCV fl	47.0 ± 1.32		48.3 ± 0.43	
MCH pg	14.8 ± 0.42		15.3 ± 0.84	
MCHC g / dl	31.5 ± 0.41		31.6 ± 1.75	

採血日の前日から約16時間絶食。

固型飼料: Picolab Mouse Diet 20 5058 (米国PMIフーズ社)

血液学的性状: エーテル麻酔下で腹大動脈より採血した血液 (アングロット/ET; 日本商事 添加) をCoulter Counter T-660で測定。

RBC: 赤血球数

BP: 血小板数

Ht: ヘマトクリット値

MCV: 平均赤血球容積

Hb: ヘモグロビン量

MCH: 平均赤血球色素量

WBC: 白血球数

MCHC: 平均赤血球色素濃度

血液化学的性状 平均値 ± 標準偏差 (N: 検査例数)

項目 / 単位	雄		雌	
	10週齢 (N:10)		10週齢 (N:10)	
TP g / dl	5.3 ± 0.13		5.3 ± 0.10	
ALB g / dl	1.7 ± 0.08		1.8 ± 0.05	
A/G	0.48 ± 0.025		0.53 ± 0.017	
AST(GOT) I.U. / l	50 ± 11.6		63 ± 13.4	
ALT(GPT) I.U. / l	39 ± 15.6		32 ± 7.6	
ALP I.U. / l	337 ± 38.5		450 ± 26.8	
GLU mg / dl	157 ± 27.8		122 ± 17.5	
T.CHO mg / dl	98 ± 5.6		78 ± 4.9	
TG mg / dl	55 ± 9.4		23 ± 10.5	
PL mg / dl	189 ± 10.7		145 ± 13.4	
T.BIL mg / dl	0.33 ± 0.084		0.50 ± 0.143	
BUN mg / dl	26.3 ± 3.17		20.2 ± 2.74	
CRE mg / dl	0.5 ± 0.05		0.4 ± 0.05	
IP mg / dl	8.3 ± 1.36		8.2 ± 1.24	
Ca mEq / l	4.63 ± 0.083		4.53 ± 0.104	
Na mEq / l	146.9 ± 1.35		146.2 ± 1.27	
K mEq / l	6.05 ± 0.330		5.60 ± 0.739	
Cl mEq / l	117.8 ± 1.66		118.9 ± 2.32	

採血日の前日から約16時間絶食。

固型飼料: Picolab Mouse Diet 20 5058 (米国PMIフーズ社)

エーテル麻酔下で腹大動脈より採血、2~3匹をプールし、分離した血清は -80 で保存した後、日立-736/10型オートアナライザーで測定。

Na、K はFLAME PHOTOMETER FLAME-30Cで、ClはCHLOR METER C-200AP で測定。

(測定方法) TP: 総蛋白質量

: Biuret法

T.BIL: 総ビリルビン量: Diazo法

ALB: アルブミン量

: BCG法

BUN: 尿素窒素量: Urease-GLDH法

A/G: アルブミン/グロブリン比

: ALB/(TP-ALB)

CRE: クレアチニン量: Jaffé法

AST: アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ活性: NADH UV-rate assay法

IP: 無機リン: Fiske-Subbarow法

ALT: アラニンアミノトランスフェラーゼ活性: NADH UV-rate assay法

Ca: カルシウム: OCPC法

ALP: アルカリ性ホスファターゼ活性

: p-NPP法

Na: ナトリウム: 炎光光度法

GLU: グルコース量

: GLK-G6PDH法

K: カリウム: 炎光光度法

T.CHO: 総コレステロール量

: CE-CO-POD法

Cl: クロライド: 電量滴定法

TG: トリグリセライド量


: LPL-GK-GPO-POD法

PL: リン脂質量

: PLD-COD-POD法

A/J マウス

体重曲線



測定匹数：各20匹 固型飼料：Picolab Mouse Diet 20 5058 (米国PMIマウス社)

系統	性別	週齢	3w	4w	5w	6w	7w	8w	9w	10w
A/J		Mean	9.7	15.2	18.5	20.3	21.8	22.7	24.5	25.0
		S.D.	0.5	0.2	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
		Mean	9.7	14.8	16.7	17.8	18.8	19.2	20.4	20.7
		S.D.	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4

臓器重量

平均値 ± 標準偏差 (N : 検査例数)

臓器名	単位	雄	雌
		10週齢 (N:10)	10週齢 (N:10)
体重	g	25.8 ± 2.6	22.5 ± 1.5
(実重量)			
脳	g	0.416 ± 0.012	0.426 ± 0.012
心臓	g	0.102 ± 0.011	0.093 ± 0.005
肺臓	g	0.152 ± 0.013	0.143 ± 0.012
腎臓 (左)	g	0.152 ± 0.015	0.113 ± 0.027
(右)	g	0.148 ± 0.016	0.123 ± 0.008
脾臓	g	0.068 ± 0.012	0.073 ± 0.022
肝臓	g	0.909 ± 0.079	0.829 ± 0.063
精巣 (左)	g	0.087 ± 0.012	
(右)	g	0.090 ± 0.012	
卵巣 (左)	mg		5.5 ± 1.1
(右)	mg		5.2 ± 1.2
胸腺	g	0.031 ± 0.005	0.034 ± 0.003
(100g体重比)			
脳	mg%	1620.94 ± 124.82	1902.78 ± 116.92
心臓	mg%	395.57 ± 25.94	416.05 ± 16.60
肺臓	mg%	589.38 ± 40.96	636.93 ± 43.72
腎臓 (左)	mg%	589.56 ± 39.43	498.26 ± 108.39
(右)	mg%	571.45 ± 39.88	548.78 ± 34.16
脾臓	mg%	266.84 ± 64.02	331.90 ± 119.29
肝臓	mg%	3529.75 ± 275.31	3692.98 ± 172.02
精巣 (左)	mg%	337.90 ± 41.83	
(右)	mg%	348.76 ± 47.50	
卵巣 (左)	mg%		24.62 ± 5.26
(右)	mg%		23.16 ± 5.20
胸腺	mg%	122.07 ± 23.97	153.24 ± 22.31